

BACTIFOS *Powder*

Drijfmest-
verbeteraar

**Biologische
mestbehandeling**



BACTIFOS Powder

Biologische mestbehandeling




EIGENSCHAPPEN

- Bevat **gunstige bacteriën** die de microflora van de mest versterken
 - Bevat **enzymen** die de organische stof breken
 - Bevat **prebiotica** die de mestmicroflora stimuleren
 - Bevat **bindmiddelen voor** het aanwezige **ammoniak**
 - Bevat **plantenextracten, kleisoorten, verrijkte silica, zeewieren, sporenelementen**
- ➔ **Verbetert de bemestingswaarde van de drijfmest**

HOE WERKT HET ?

Opgeslagen drijfmest : een te controleren levend medium



* NH_3 =ammoniak, H_2S = waterstofsulfide, VOS = vluchtige organische stoffen

Drijfmest kwaliteit

+++++

Gebruiks-gemak

+++++

Doeltreffendheid

+++++

GEBRUIKSAANWIJZING

- Het BACTIFOS-poeder dient verspreid te worden op de drijfmest (NIET rechtstreeks op de mestkorst) of door de roosters (in het bijzonder ver verwijderd van de ledigingsopening, in de zones met luchtstroming ...)
- Roer de drijfmest regelmatig, vooral bij het aanbrengen van BACTIFOS-poeder. Wanneer u niet over een mestmixer beschikt, kunt u water of verse drijfmest uitgieten om de mestkorst te breken en te mengen
- Varkens
 - Zeugenstal en kraamhok: 50 g per zeug één keer per maand
 - Biggenbatterij: Eénmalig 30g per big voor de aankomst van de biggen
 - Vleesvarkensstal: 60 g tot 100 g per vleesvarken gedurende de mestperiode
 - Bij aanzienlijke mestkorsten of afzettingen: voeg bij het eerste gebruik als startdosis 60 g Bactifos Powder toe in één enkele keer per varken in eenzelfde hok (zelfde put) het verste verwijderd van het luik of de ledigingsklep; voeg daarna gedurende de 2 volgende maanden 20 g/varken/maand toe.
- Rundvee
 - Onderhoud: 30 g/m³ drijfmest - per maand
 - Bij aanzienlijke mestkorsten of afzettingen: 150 g/m³ drijfmest, daarna 70 g/m³ per maand